

# 最新幼儿园预防肺结核总结(大全5篇)

总结的选材不能求全贪多、主次不分，要根据实际情况和总结的目的，把那些既能显示本单位、本地区特点，又有一定普遍性的材料作为重点选用，写得详细、具体。那么我们该如何写一篇较为完美的总结呢？下面是小编为大家带来的总结书优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 幼儿园预防肺结核总结篇一

**【商品名称】**肺结核丸(张恒春)

**【拼音全码】**feijiehewan(hengchun)

**【主要成份】**龟甲(醋制)、牡蛎、鳖甲(醋制)、地黄、熟地黄、天冬等。

**【性状】**肺结核丸(恒春)为棕黄色的大蜜丸;气微，味甘、苦，嚼之有砂粒感。

**【适应症/功能主治】**针对结核病有养血、补血、止血和祛风作用。敛疮、逐淤、破积、通络、理伤。清热解毒;行气利湿之功效。

**【规格型号】**81g

**【用法用量】**口服，一次9g一日3次。

**【不良反应】**尚不明确。

**【禁忌】**对肺结核丸(恒春)过敏者禁用。

**【注意事项】**1. 忌服辛辣刺激性食物。2. 对肺结核丸(恒春)过敏者禁用，过敏体质者慎用。3. 药品性状发生改变时禁止

服用。4. 请将此药放在儿童不能接触的地方。5. 如正在服用其他药品，使用肺结核丸(恒春)前请咨询医师或药师。

**【药物相互作用】**如与其他药物同时使用可能会发生药物相互作用，详情请咨询医师或药师。

**【贮藏】**密封。

**【包装】**81g/瓶。

**【有效期】**24月

**【批准文号】**国药准字z34020948

**【生产企业】**芜湖张恒春药业有限公司

肺结核丸(张恒春)的功效与作用肺结核丸(张恒春)针对结核病有养血、补血、止血和祛风作用。敛疮、逐淤、破积、通络、理伤。清热解毒;行气利湿之功效。

## 幼儿园预防肺结核总结篇二

第一段：介绍大学生肺结核的现状（200字）

随着大学生的规模逐年增加，大学校园内也呈现出了肺结核病的高发态势。大学生肺结核不仅给个人的健康带来威胁，也给校园的公共卫生安全带来风险。肺结核是一种慢性传染疾病，主要通过空气飞沫传播，与不良的生活习惯和生活环境相关。大学生群体由于学习压力大、生活习惯不规律等原因，更容易患上肺结核。因此，大学生肺结核的防控工作至关重要。

第二段：大学生肺结核的危害及其原因分析（250字）

大学生肺结核不仅给患者本人的身体健康带来威胁，还会造成其他学生的感染风险。肺结核患者常常会咳嗽、咳痰，排放含有结核杆菌的呼吸道飞沫，如果不慎被他人吸入，就有可能引发肺结核的传播。大学生尤其容易感染肺结核的原因有很多，首先是大学生在校期间，生活方式和生活环境的改变。大学生通常居住在集体宿舍里，人员聚集，卫生条件相对较差，容易发生结核病的传播。此外，大学生的作息规律不强，饮食不规律，加上学业压力和社交压力大，使得大学生的免疫力下降，容易受到结核杆菌的侵袭。

### 第三段：大学生肺结核的防治措施（300字）

要有效防止大学生肺结核的发生，需要大学生和学校共同努力。对于大学生个人而言，应该培养良好的卫生习惯，保持室内空气流通，勤洗手，咳嗽时用纸巾或手肘遮挡口鼻，并避免与肺结核患者近距离接触。同时，大学生应当合理安排作息时间，保持充足的睡眠和营养，提高身体免疫力，增加抵抗疾病的能力。学校方面，应加强对学生的健康教育和宣传，定期组织健康检查，发现早期感染者，及时进行治疗和隔离。此外，学校还要改善宿舍条件，提高环境卫生水平，减少疾病传播的机会。

### 第四段：大学生肺结核患者的心理支持（250字）

肺结核患者需要得到周围人的理解和支持，尤其是大学生群体。因为患上肺结核的学生可能会经历学业中断、社交隔离、自我否定等问题，所以家人、朋友、学校和社会的关心和支持非常重要。大学生应当积极主动地关心和帮助身边的肺结核患者，给予他们鼓励和理解，使他们更加积极面对疾病的挑战，坚信自己能够战胜病魔。同时，大学生也需克服对肺结核的误解和歧视，用正确的态度面对肺结核患者，给予他们宽容和温暖的人际关系。

### 第五段：加强大学生肺结核防控的必要性和挑战（200字）

加强大学生肺结核防控工作，不仅关系到大学生个人的健康和未来发展，也关系到校园的公共卫生安全。大学生是国家的未来，他们的健康状况决定着国家的未来。尽管大学生肺结核的防控工作面临着一系列的挑战，如防控意识淡薄、资源匮乏等问题，但只要大家共同努力，加强宣传教育，改善生活环境，提高自身素质，确保自己的健康，大学生肺结核的发病率一定能得到有效的控制。

总结：大学生患上肺结核不再是个别现象，而是一种普遍存在的问题。只有共同努力，改变不良的生活习惯，提高健康意识，才能有效预防大学生肺结核的发生和传播。这不仅是大学生的责任，也是学校、家庭和社会的共同责任。

## 幼儿园预防肺结核总结篇三

原料：胡萝卜1000克，蜂蜜100克，明矾3克。

做法：将胡萝卜洗净切片，加水350克，煮沸20分钟，去渣取汁，加入蜂蜜、明矾，搅匀，再煮沸片刻即成。日服3次，每次服50克。

功效：祛痰止咳。适用于咳嗽痰白、肺结核咳血等症。

### 2、地骨皮老鸭汤

原料：老鸭1只，地骨皮20克，生姜3片，调料适量。

做法：将老鸭去毛杂，洗净，切块；余药布包，同入锅中，加清水适量同煮至老鸭熟后去药包，调味服食。

功效：可滋阴润肺，凉血止咳，适用于肺结核肺阴亏损，干咳，咳声短促，痰中有时带血，手足心热等。

### 3、京酱蔬菜汤

原料：胡萝卜、冬瓜、山药各50克，西兰花、番茄、白菜各50克，葱花适量。甜面酱1小匙，胡椒粉1小匙，骨头汤1大碗，盐、白糖、香油适量。

做法：食材a去皮清洗切成块；食材b也都清洗干净，西兰花切小朵，白菜切片，番茄热水氽汤去皮，滚刀切。骨头汤倒入锅中，先下食材a加甜面酱加少许水调好，食材a煮熟后倒入汤中。倒入食材b加白糖、胡椒粉、盐煮入味，倒出，滴香油即可。

功效：西兰花能爽喉、开音、润肺止咳，该食疗方能缓解肺结核症状。

#### 4、党参银耳牛蛙汤

原料：党参20克，银耳30克，牛蛙500克，胡萝卜1根。

做法：牛蛙处理干净后切小块，银耳放水里泡开后撕小朵，胡萝卜去皮洗净切块，党参洗净备用。把处理干净的牛蛙放入沸水中氽汤后，捞出备用。取砂锅，加清水煮沸后放入所有的食材，先用大火煮20分钟，后改小火慢煲2小时，最后加盐调味即可。

功效：该汤可滋阴降火，清心润肺，补中益气。

#### 5、羊髓生地羹

原料：羊脊髓、蜂蜜各50克，生地10克，熟羊脂油15克，黄酒25克，生姜丝、精盐各少许。

做法：先将羊脊髓、生地一同放入锅内，加水煮汤至熟透，捞去药渣，再加入熟羊脂油、精盐、生姜丝、黄酒、蜂蜜等，加热至沸即成。一顿或分顿食用。

功效：滋阴清热，止咳化痰。适用于肺结核之低热、咳嗽、咳痰等症。

## 幼儿园预防肺结核总结篇四

经过多年来对肺结核病的积极防治，我国初治肺结核病人的治愈率已达95%，5年复发率亦不超过5%，但是仍有很多患者发病后没有得到及时的治疗，错过了最佳治疗时机，致使初治失败，从而病情迁延不愈，成为难治性肺结核和重症肺结核，其中有很多产生了多发空洞、巨大空洞、毁损肺，长期排菌或合并反复咯血，需要手术治疗。据有关文献统计约有2%~5%肺结核患者需要外科治疗，而因为种种原因，外科治疗术后仍有少量患者出现病情复发。本文重点对接受肺切除术治疗的肺结核患者，术后复发的原因进行分析和讨论。

### 1临床资料

本院从2000—2010对560例年龄在18~60岁之间的肺结核患者，分别进行了肺叶、全肺、肺楔形切除术，其中男312例，女248例，肺叶切除421例，全肺85例，楔形切除54例。术后复发26例，占4.6%，复发病例中，年龄集中在20~40岁之间，其中3例合并有糖尿病。肺叶切除术后复发24例，复发率5.7%；全肺切除术后复发0例，复发率为0；楔形切除术后复发2例，复发率3.7%。

### 2讨论

#### 2.1术前准备不充分

肺结核病人术前应规范合理的抗结核治疗4~6个月，这一原则已得到广泛的认可，但在临床工作中，常常因为种种原因，致使用药时间过短，从而不能有效地抑制和控制余肺中的结核病灶，是术后复发的主要原因，尤其是起病比较急的患者，包括大咯血和有巨大或多发空洞的病例，因为保守治疗很难

治愈，患者及其家属大多手术要求坚决、急迫，往往术前抗结核治疗不足2个月，就匆忙施行了肺切除手术。

## 2.2 术后没有坚持合理的治疗

很多患者在接受手术治疗之后，病情恢复很快，立即肺结核的反复咳嗽、咯血、发热、乏力等症状，而余肺x线片又看不到明显的残余病灶，从心理上有麻痹和侥幸心理，没有遵照医嘱，继续科学有效的抗结核治疗一年以上。

## 2.3 不同术式术后疗效不尽相同

在本组病例中，接受肺叶切除术的患者，术后复发率较高，全肺和楔形切除术后复发率较低。分析其原因是因为接受肺叶切除术的，大多是伴有咳血或有空洞形成的患者，常常术前抗结核治疗时间较短，另外肺叶切除后，患侧余肺都有不同程度的过度膨胀，致使一些原本处于休眠状态的结核病灶，很快转变成活动性病灶，如果没有马上得到强有力的抗结核治疗，病情会迅速进展、加重。全肺切除的患者不存在同侧余肺的过度膨胀问题，健侧肺组织的膨胀相对有限。楔形切除的病例，一般是病灶较小而且集中的结核球，楔形切除大多能够把结核病灶完全切除，而术后余肺体积亦无明显变化，不存在过度膨胀。

## 2.4 合并疾病的影响

本组复发病例中有3例合并患有糖尿病，虽然围手术期对糖尿病病情进行了良好的控制，但由于术后没能对糖尿病进行有效的治疗，成为病情复发不可忽视的原因。

## 2.5 年龄因素

本组病例中，复发病例年龄全部集中在20~40岁之间，这部分青壮年病人，大多工作与生活压力比较大，自律性差，抗

结核药物的服用常常不规律，身体得不到充分的休养，抗病能力降低，致使病情复发。

另外，在这些复发的相对年轻的患者中，存在一个共同的特点值得注意，那就是所有术前存在巨大空洞的患者，术后复发，无一例外的在余肺中再次出现较大的空洞，这一现象再一次提示我们，空洞型肺结核患者的空洞形成，可能与其体内特殊的炎症反应过程，引起较强的变态反应有关，空洞的形成有其特有的机理。肺切除治疗肺结核，只要谨慎选择适应证，认真做好术前、术后的抗结核治疗和综合治疗，就能够有效地提高手术治愈率，降低复发率，帮助患者彻底摆脱结核病的困扰。

## 幼儿园预防肺结核总结篇五

第一段（引言）：

肺结核是一种具有慢性病程的传染性疾病，常见于肺部，但也可以侵犯其他部位。大学生作为一个特殊的群体，在面对肺结核的风险时应当加倍警惕。在大学期间，我们应该增强对肺结核的认识，积极采取措施预防疾病的传播。通过个人亲身经历，我深刻地体会到了大学生肺结核的重要性，并总结出几点关键的体会。

第二段（认识肺结核的重要性）：

首先，认识到肺结核的重要性是大学生肺结核防控的第一步。在大学校园里，人员流动快，人口密度大，为肺结核的传播提供了条件。大学生生活习性不良，比如吸烟、熬夜等，会降低免疫力，增加感染结核杆菌的风险。因此，了解肺结核的传染途径、症状和预防方法对于大学生来说是至关重要的。只有深刻认识到肺结核的威胁，我们才能做好相应的预防工作。

### 第三段（自我防护措施）：

其次，采取自我防护措施是预防大学生肺结核的关键。我们应该养成良好的生活习惯，保持良好的卫生习惯，包括勤洗手、不随地吐痰等。此外，适量锻炼身体、保持良好的饮食习惯也是增强抵抗力的重要手段。尤其要注意保持合理的作息時間，避免长时间熬夜，这有助于提高免疫力，减少感染肺结核的风险。此外，大学生生活中要避免过度劳累、保持心理健康也是预防肺结核的重要因素。只有综合采取这些自我防护措施，我们才能有效预防大学生肺结核的发生。

### 第四段（早期发现和治理的重要性）：

早期发现和治理对于大学生肺结核来说至关重要。如果发现自己有肺结核的症状，应立即去医院进行相关检查，以确诊和早期治疗。及时发现和治理，不仅可以避免疾病的恶化，还可以减少疾病的传播风险。大学生作为群体中的重要组成部分，应当树立正确的健康观念，勇于就医，积极配合医生进行治疗。

### 第五段（重视社会责任，共同防控）：

最后，加强对大学生肺结核的防控充满挑战，需要全社会的共同努力。学校应加强对学生的健康管理和宣传教育，提高学生自我防护和早期发现的意识。同时，社会应加大对大学生肺结核防控的关注和投入，提供更好的医疗服务和防控措施。政府可以加大对肺结核疫苗的推广和普及，全社会共同努力，才能有效预防和控制大学生肺结核的发生。

### 总结：

大学生肺结核的防控需要我们的认识、自我防护、早期发现和治理以及社会共同努力，才能取得最好的效果。作为大学生，我们要主动学习有关肺结核的知识，养成良好的生活习

惯，及时就医治疗，同时，也要加强对肺结核防控工作的关注，共同为创造一个健康的大学校园做出贡献。我们相信，在我们共同努力下，大学生肺结核将不再成为困扰我们的威胁。