# 预防传染病班会内容 冬季传染病预防班 会设计方案(优质5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。 写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。 范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是我为大家搜集 的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

## 预防传染病班会内容篇一

让学生了解了在日常学习生活中要养成良好的个人卫生习惯,加强体育锻炼,增强抵抗力等等,使学生们懂得了只有好的、健康的身体才能更好的学习。增长学生的卫生知识,增强学生的自我保健意识。

- 1. 呼吸道传染病易发生在冬春季节,流行范围广,传播速度快,易见于婴幼儿、老年人和体弱多病者。
- 2. 在幼儿园、学校、养老院或家庭成员中,如果有呼吸道传染病人时,其他成员就很容易被传染患病,如不及时预防控制,便能在短时间内引起流行,因此,应积极预防。
- 3. 要搞好环境卫生,不要随地吐痰。
- 4. 要勤晒被褥、勤换洗衣服,搞好家庭及个人卫生。
- 5. 经常开窗通风,保持室内空气新鲜。
- 6. 勤洗手 呼吸道传染病患者的鼻涕、痰液等呼吸道分泌物中含有大量的病原,有可能通过手接触分泌物,传染给健康人。因此,特别强调注意手的卫生。
- 7. 多喝水 特别在秋冬季气候干燥,空气中尘埃含量高,人体

- 鼻黏膜容易受损,要多喝水,让鼻黏膜保持湿润,能有效抵御病毒的入侵,还有利于体内毒素排泄,净化体内环境。
- 8. 要坚持体育锻炼和耐寒锻炼;适当增加户外活动(但雾天不要晨练,因为浓雾中不仅含有大量有害物质,而且水汽较多,会影响人体肺部的气体交换)。
- 9、注意营养,适当增加水和维生素的摄入。
- 10、咳嗽、打喷嚏时捂住口鼻,防止污染空气。
- 11. 不要共用毛巾和卫生间个人用品。
- 12、生活有规律、保证睡眠、不吸烟、少饮酒,并注意保暖防止感冒,提高自身的免疫力。
- 13、尽量减少和患者及其患者家属接触也是预防的关键。
- 14、可进行免疫预防 流行季节前可进行相应的预防接种,如流感、肺炎、麻疹、流脑等疫苗能有效预防相应的呼吸道传染病。尤其要加强流动人口的计划免疫管理。
- 15、发生呼吸道传染病时,要及时进行治疗,最好是分房隔离、限制活动。
- 16、要早发现病人、早报告、早隔离、早治疗。
- 17、不要到病家探视病人,不要去疫村,不要到发病地区赶集、探亲。
- 1、学习、了解卫生防病知识,树立传染病的防病意识。
- 2、接种相应的疫苗,预防性疫苗是抵抗传染病发生的最佳手段。

- 3、注意劳逸结合、合理体育锻炼,增强机体抵抗疾病能力。
- 4、开窗通气,尽量减少到空气不流通、人多拥挤的场所。
- 5、注意个人卫生,养成良好的卫生习惯,饭前便后要洗手、 不喝生水、不吃不洁净的食物,把好"病从口入关"。
- 6、遇到气候变化,注意增减衣服。
- 7、坚持晨检,发生病例后,应及时隔离治疗。
- 8、做好消毒工作。
- 1、要在本周完成好此项工作,并出好一期黑板报。
- 2、教育学生注意个人卫生,养成良好的卫生习惯,有效预防控制传染病。

# 预防传染病班会内容篇二

- 1、了解有关幼儿容易传染上的传染病的情况。
- 2、根据自己的生活经验说出预防疾病的方法。
- 3、在传染病高发期时,有自我保护预防的意识。
- 1、有关传染病的资料与图片。
- 2、手足口病病症的图片及预防的方法ppt[]
- 一、师幼谈话,由幼儿比较熟悉的手足口病谈到传染病。
- 1、讨论春秋季为什么是流行传染病的多发季节? (春天和秋天气候乍暖还寒阴雨绵绵,潮湿多雾,气候多变)

- 2、教师告诉幼儿春秋季会有哪些流行传染病会出现? (如:感冒、麻疹、咳嗽、腮腺炎、水痘、手足口病等)
- 3、重点介绍手足口病的临床表现。
- 4、请幼儿讲述自己生病时的经历和感受。(如请医生诊治,要定时服药,多休息,多喝水,痊愈后才回幼儿园上课等)
- 二、教师讲述手足口病的传播途径。
- 1、幼儿运用自己的已有经验讨论讨论。
- 2、请语言能力强的幼儿到前面来讲一讲小朋友们的经验。
- 3、教师小结:咳嗽,打喷嚏,吐口水,毛巾及手摸过的用具上都会留下细菌,都有可能会传染手足口病的。
- 4、很多传染病的传播途径和手足口病是一样的。
- 三、幼儿讨论:如何预防手足口病。
- 1、提问:我们应该怎样预防传染病?
- 2、幼儿自由回答。
- 3、教师小结:多喝开水,多吃蔬菜水果、不挑食,勤洗手,勤剪指甲,不喝生水,打预防针,不接触生传染病的人群。

教师带幼儿到洗手间洗手。

# 预防传染病班会内容篇三

通过本次班会的教育,使学生了解春季传染病的种类、症状以及预防措施,能加强学生的卫生防控意识,提高学生的自我保护能力,为学生的健康成长奠定基础。

## 一、谈话导入:

同学们,你们知道吗?春季是疾病特别是传染性疾病的多发季节,你们知道有哪些常见的传染性疾病吗?它们是怎样传播的?春季常见的传染病的预防措施有哪些?这次班会,我们就一起来研究这些问题。

- 二、介绍春季常见传染病的种类和症状及传播途径。
- 1、流感(流行性感冒)

流行性感冒简称流感,由流感病毒引起的急性呼吸道传染病, 具有很强的传染性,其发病率占传染病之首位。潜伏期1—3 日,主要症状为发热、头痛、流涕、咽痛、干咳,全身肌肉、 关节酸痛不适等,发热一般持续3—4天,也有表现为较重的 肺炎或胃肠型流感。传染源主要是病人和隐性感染者,传染 期为1周。传播途径以空气飞沫直接传播为主,也可通过被病 毒污染的物品间接传播。人群对流感普遍易感。

## 2、流脑(流行性脑脊髓膜炎)

流行性脑脊髓膜炎简称流脑,它是由脑膜炎双球菌引起的急性呼吸

道传染病,传染性较强。流脑发病初期类似感冒,流鼻涕、咳嗽、头痛、发热等。病菌进入脑脊液后,头痛加剧,嗜睡、颈部强直、有喷射样呕吐和昏迷休克等危重症状。传染源主要病人或带菌者,传播途径以空气飞沫直接传播为主,潜伏期一般为2—3天,最长的为一周。人群普遍易感,好发于小年龄段儿童。

### 3、麻疹

麻疹是由麻疹病毒引起的急性传染病,潜伏期8—12日,一

般10天左右可治愈。典型的临床症状可概括为"三、三、三",即前驱期3天:出疹前3天出现38度左右的中等度发热,伴有咳嗽、流涕、流泪、畏光,口腔颊粘膜出现灰白色小点(这是特点);出疹期3天:病程第4-5天体温升高达40度左右,红色斑丘疹从头而始渐及躯干、上肢、下肢;恢复期3天:出疹3-4天后,体温逐渐恢复正常,皮疹开始消退,皮肤留有糖麸状脱屑及棕色色素沉着。麻疹是通过呼吸道飞沫途径传播,病人是唯一的传染源。患病后可获得持久免疫力,第二次发病者极少见。未患过麻疹又未接种过麻疹疫苗者普遍具有易感性,尤其是6个月~5岁幼儿发病率最高(占90%)。

## 4、水痘

水痘是传染性很强的疾病,由水痘——带状疱疹病毒引起的。 水痘的典型临床表现是中低等发热,很快成批出现红色斑丘 疹,迅 传播途径是指病原体离开传染源到达健康人所经过的 途径。病原体传播的主要途径有:空气传播,水传播,饮食 传播,接触传播,生物媒介传播等。

预防传染病的一般措施也可以分为以下三个方面。

## 1. 控制传染源

对传染病人要尽可能做到早发现、早诊断、早报告、早治疗、早隔离,防止传染病蔓延。患传染病的动物也是传染源,也要及时地处理。这是预防传染病的一项重要措施。

#### 2. 切断传播途径

切断传播途径的方法,主要是讲究个人卫生和环境卫生。

## 3. 保护易感者

进行预防接种,提高易感人群的抵抗力。积极参加体育运动,

锻炼身体,增强抗病能力。开展爱国卫生运动,搞好环境和个人的卫生。

- 1. 合理膳食,增加营养,要多饮水,摄入足够的维生素,宜 多食些富含优质蛋白、糖类及微量元素的食物,如瘦肉、禽 蛋、大枣、蜂蜜和新鲜蔬菜、水果等;积极参加体育锻炼,多 到郊外、户外呼吸新鲜空气,每天散步、慢跑、做操、打拳 等,使身体气血畅通,筋骨舒展,增强体质。
- 3. 勤洗手,并用流动水彻底清洗干净,包括不用污浊的毛巾擦手;
- 4. 每天开窗通风,保持室内空气新鲜,尤其宿舍、电脑室、教室等;
- 6. 不食、不加工不清洁的食物,拒绝生吃各种海产品和肉食,及吃带皮水果,不喝生水。不随便倒垃圾,不随便堆放垃圾,垃圾要分类并统一销毁。
- 7. 注意个人卫生,不随便吐痰,打喷嚏;
- 9. 避免接触传染病人,尽量不到传染病流行疫区;
- 10. 传染病人用过的物品及房间适当消毒,如日光下晾晒衣被,房内门把手、桌面、地面用含氯消毒剂喷洒、擦拭。

## 六、总结:

春季传染病虽然种类繁多,但只要我们重视预防工作,做到早发现、早隔离、早诊断、早治疗,就可以有效地阻断传染病的流行与传播。

## 预防传染病班会内容篇四

- 1、春季传染病相关类型与相关知识了解。
- 2、学会如何预防春季传染病,进行相关知识的了解。

## :讲解和讨论

春季是呼吸道传染病的高发季节,由于天气多变,时暖时寒,气候仍然寒冷、干燥,特别是在北方,人们经历了一个漫长的冬天,当春季来临时,人体内环境很难一下子与外界环境相适应,人体的免疫力相对低下,病菌、病毒等致病微生物趁机而入、侵袭人体,特别容易引起流感、流脑、流腮等呼吸道传染病,同时随着气温转暖,手足口病等传染病也逐渐抬头。若平时不注意锻炼,再加上室内空气不流通,很容易发生呼吸道传染性疾病的流行。

## 流行性感冒

流行性感冒简称流感,是由流感病毒引起的急性呼吸道传染病,具有很强的传染性。流感病毒分为甲、乙、丙三型。

传播途径:以空气飞沫直接传播为主,也可通过被病毒污染的物品间接传播。

主要症状:有发热、全身酸痛、咽痛、咳嗽等症状。

易感人群:人群对流感普遍易感,病后有一定的免疫力,但维持的时间不长,病毒不断发生变异,可引起反复感染发病。

预防措施:接种流感疫苗已被国际医学界公认是防范流感的最有效的武器。由于流感病毒变异很快,通常每年的流行类型都有所不同。因此,每年接种最新的流感疫苗才能达到预防的效果。另外,锻炼身体,增强体质,在流感季节经常开窗

通风,保持室内空气新鲜,老年人、儿童尽量少去人群密集的地方等等,也是预防流感的有效措施。

## 麻疹

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性呼吸道传染病,主要发生 在冬春季节。凡是没有接种过麻疹疫苗,接触后90%以上均会 发病,1-5岁小儿发病率最高。

传播途径:病人是唯一的传染源,病人的眼结膜、鼻、口、咽等处的分泌物(如眼泪、鼻涕、痰等)以及尿和血液中都存在着麻疹病毒。

主要症状:麻疹的潜伏期为10-11天,开始时症状像感冒,但同时出现眼红、眼皮发肿、流泪、怕光、打喷嚏、咳嗽等更严重的症状。第4天起从耳朵后面开始出现玫瑰色的斑丘疹,2-3天内皮疹遍及全身,随后疹退,脱屑。其他症状也逐渐消退。

易感人群:人群普遍易感,多见于婴幼儿,但近年来由于麻疹疫苗的广泛接种,发病年龄有后移趋势。

预防措施:尽量减少和患者及其患者家属接触是预防麻疹的关键。做好保健工作,按时接种麻疹疫苗,室内空气流通,流行季节少到公共场所,锻炼身体,增强抗病能力。

## 水痘

水痘是一种由水痘带状疱疹病毒所引起的急性传染病。水痘患者多为1-14岁的孩子。在幼儿园和小学最容易发生和流行。虽然水痘属于急性传染病,但通常比较温和,不会引起严重的并发症。

传播途径:水痘主要通过飞沫经呼吸道传染,接触被病毒污染

的尘土、衣服、用具等也可能被传染。

主要症状:水痘病毒感染人体后,经过大约2周的潜伏期,患者可出现头痛、全身不适、发热、食欲下降等前期症状,继而出现有特征性的红色斑疹,后变为丘疹、再发展为水疱、常伴有瘙痒,1-2天后开始干枯结痂,持续一周左右痂皮脱落。皮疹躯干部最多,头面部次之,四肢较少,手掌、足底更少。

易感人群:人群普遍易感。常见于2-10岁的儿童,一次发病可终身获得较高的免疫力。

预防措施:接种水痘疫苗是最有效、最经济的预防措施。流行期间小孩子不去人多的公共场所,经常开窗通风等也很重要。

## 风疹

风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病。

传播途径:传染源主要是病人和先天性风疹的患儿,病人鼻咽部分泌物(如鼻涕、痰等)、血及尿中均带有病毒,主要经空气飞沫传播,一年四季均可传染得病,以冬春季为多。风疹病毒还可通过胎盘感染胎儿,如果孕妇在怀孕期间感染本病,可导致胎儿畸形。

主要症状:以低热、上呼吸道轻度炎症、全身散布红色斑丘疹 及耳后、枕部淋巴结肿大为特征,若孕妇在妊娠早期感染风 疹可能导致胎儿先天畸形。

易感人群:好发于1-5岁儿童,育龄妇女;成人偶见感染。

预防措施:风疹的预防与麻疹、水痘等出疹性传染病不同,其对象不仅仅是儿童,同时还应当包括育龄妇女。预防风疹最可靠的手段是接种风疹疫苗。在春季风疹高发期,尽量少带儿童到人群密集的场所,如商场、影院等地,避免与风疹病

人接触。孕妇尤要当心,以免感染而殃及胎儿。保持室内开窗通风,空气流通,增加户外活动,加强体育锻炼,讲究个人卫生。

## 流行性腮腺炎

流行性腮腺炎简称腮腺炎,亦称"痄腮",是一种通过飞沫 传播的急性呼吸道传染病。冬春季节容易发生,多发生于儿 童。

传播途径: 病人是唯一的传染源,主要通过飞沫传染,少数通过用具间接传染,传染性强。

主要症状:本病大多数起病较急,有发热、畏寒、头痛、咽痛等全身不适症状。患者一侧或双侧耳下腮腺肿大、疼痛,咀嚼时更痛。并发症有脑膜炎、心肌炎、卵巢炎或睾丸炎等。整个病程约7-12天。

易感人群: 多见于5到15岁的儿童和青少年。一次感染后可获 终生免疫。

预防措施: 及时隔离患者至消肿为止。接种腮腺炎疫苗。

流行性脑脊髓膜炎

流行性脑脊髓膜炎, 简称流脑, 是由脑膜炎双球菌引起的急性呼吸道传染病。

传播途径: 大多是通过呼吸道飞沫传播而感染。

主要症状:最初表现为上呼吸道感染,多数病人无明显症状,随后病人突然寒战,高热体温可达40℃,头痛、呕吐反复发作,早期皮肤上可见出血点或淤斑,1-2日内发展为脑膜炎,高热持续不退,头痛剧烈,频繁的呕吐,伴有惊厥,甚至出

现昏迷。

易感人群:人群普遍易感。儿童发病率高。

预防措施:免疫接种是预防流脑的主要措施,接种对象为1-15周岁儿童。

手足口病

手足口病是由多种肠道病毒引起的一种儿童常见传染病。

传播途径:主要经消化道或呼吸道飞沫传播,亦可经接触病人皮肤、粘膜疱疹液而感染。

主要症状: 先出现发烧症状, 手心、脚心出现斑丘疹和疱疹(疹子周围可发红), 口腔粘膜出现疱疹和/或溃疡, 疼痛明显。部分患者可伴有咳嗽、流涕、食欲不振、恶心、呕吐和头疼等症状。少数患者病情较重, 可并发脑炎、脑膜炎、心肌炎、肺炎等。

易感人群:婴幼儿和儿童普遍多发,3岁及3岁以下婴幼儿更容易得。成人感染后一般不发病,但会将病毒传播给孩子。

预防措施: 勤洗手、勤通风,流行期间避免去人群聚集、空气流通差的公共场所。儿童出现相关症状要及时到正规医疗机构就诊。

## 人感染高致病性禽流感

人感染高致病性禽流感是由高致病性禽流感病毒引起的以呼吸道损害为主的人急性感染性疾病。

传播途径: 禽流感主要通过空气传播,病毒随病禽分泌物、排泄物及尸体的血液,器官组织、饮水和环境以及衣物、种蛋等传播,造成环境污染,亦可经过消化道和皮肤伤口而感

染。

主要症状:人禽流感的潜伏期一般为1-7天,出现早期症状与一般流感相似,主要有发热、流涕、咽痛、咳嗽等,体温可达39℃以上,伴有全身酸痛,有些病人可有恶心、腹痛、腹泻、结膜炎等。

易感人群:任何年龄均具有被感染的可能性,但一般来说12 岁以下儿童发病率较高,病情较重。与不明原因病死家禽或 感染、疑似感染禽流感家禽密切接触人员为高危人群。

预防措施: 养成良好的卫生习惯,饭前便后、接触禽类要用流水洗手;注意饮食卫生,不喝生水,进食禽肉、蛋类要彻底煮熟,加工、保存食物时要注意生、熟分开;搞好厨房卫生,不生食禽肉和内脏,解剖活(死)家禽、家畜及其制品后要彻底洗手。

## 结核病

结核病过去俗称"痨病",是由结核杆菌主要经呼吸道传播引起的全身性慢性传染病,其中以肺结核最为常见,也可侵犯脑膜、肠道、肾脏、骨头、卵巢、子宫等器官。

传播途径:活动期的排菌(也就是痰涂片阳性或者痰培养阳性)肺结核病人是主要的传染源;结核病的传播途径有呼吸道、消化道和皮肤黏膜接触,但主要通过呼吸道传播。

主要症状:结核病多为缓慢起病,长期伴有疲倦、午后低热、夜间盗汗、食欲不振、体重减轻、女性有月经紊乱等症状。严重的患者可有高热、畏寒、胸痛、呼吸困难、全身衰竭等表现。肺结核病人往往伴有咳嗽、咳痰,痰中可带血丝。结核杆菌侵犯脑膜、肠道、肾脏、骨头、卵巢、子宫等器官,可有头痛、呕吐、意识障碍、消瘦、腹泻与便秘交替,还可有血尿、脓尿、脾大、贫血以及妇科疾病的症状等。

易感人群:人群普遍易感,但是与肺结核病人有密切接触的人群;机体对结核菌抵抗力较弱的人群,如幼儿、老年人、营养不良、尘(矽)肺、糖尿病患者[hiv阳性或者艾滋病人等群体是重点人群。

# 预防传染病班会内容篇五

- 1、了解流行传染病的相关知识。
- 2、能说出并掌握预防传染病的方法。
- 3、增强自身预防疾病的意识。
- 4、培养幼儿思考问题、解决问题的能力及快速应答能力。
- 5、幼儿能积极的回答问题,增强幼儿的口头表达能力。
- 1、教学挂图和幼儿用书。
- 2、每组一张4开白纸,一盒水彩笔。
- 1、活动导入:观看教学挂图。

教师出示挂图,并提问:小朋友,请你们看一看,图上画的是什么地方?图上的小朋友在干什么?他们怎么了?(幼儿观察并描述)

- 2、活动展开:讨论什么是传染病,常见传染病有哪些。
- (1) 教师出示挂图,请幼儿按顺序观察图片,教师提问。

教师: 医院里那么多小朋友一起打点滴, 因为他们得了传染病。你们知道什么是传染病吗?常见的传染病有哪些?(幼儿讨论并回答)

- (2)教师小结:传染病是日常生活中最常见的疾病之一,它能通过呼吸、身体接触等方式传播病菌。如果有小朋友或者小动物得病,就有可能会传染给其他人,所以叫做传染病。小朋友容易得的传染病有流行性感冒、水痘、腮腺炎、红眼病等。
- 3、活动展开:阅读幼儿用书,讨论预防传染疾病的方法。
- (1)教师: 虽然传染病很容易传播,但是,如果能养成良好的卫生习惯,就能很好地预防传染病。请打开书的第17页,说一说图中的小朋友在做什么。
- (2)幼儿自由回答。
- (3)教师:小朋友,除了书上面的几种预防传染病的方法,你还知道预防传染病的其他方法吗?(幼儿讨论并回答)

教师: 多吃蔬菜水果,可以提高身体抵抗疾病的能力;勤洗手可以消除病菌;保证充足的睡眠;可以增强免疫力;接种流感疫苗可以预防流感;打喷嚏时要用手或手帕遮起来,避免对着他人打喷嚏;在传染病的多发季节避免去人多的地方;情况严重时需要戴口罩。

- 5、活动延伸:记录预防传染病的方法。
- (1)教师:现在请小朋友把刚才我们讨论的内容,用图或图夹 文的方法记录下来,每组呈现3<sup>2</sup>4种方法。
- (2) 幼儿绘画, 教师巡回指导。

小朋友又生活在集体生活中,非常有必要知道如果得了传染病一定要隔离、看医生、定时吃药,多喝水等。这次活动上下来,我觉得自己对教学中的突发事情,有些不知所措,我想在今后的教学中,一定要吸取经验,不断学习,让我的教

学机智更加灵活。